

INTISARI
ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL TRIMESTER III
PADA NY. T UMUR 40 TAHUN G₃P₂A₀Ah₂ 29⁺² MINGGU
DI PUSKESMAS SEDAYU II BANTUL
TAHUN 2017

Yuli Rian Dina¹, Nur Indah Rahmawati², Prasetya Lestari³

Latar Belakang : Menurut *World Health Organization* (WHO), pada tahun 2013 Angka Kematian Ibu (AKI) di dunia 210 per 100.000 kelahiran hidup, AKI di negara berkembang 230 per 100.000 kelahiran hidup dan AKI di negara maju 16 per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Asia Timur 33 per 100.000 kelahiran hidup. Asia Selatan 90 per 100.000 kelahiran hidup. Asia Tenggara 140 per 100.000 kelahiran hidup dan Asia Barat 74 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data yang diperoleh di Puskesmas Sedayu II Bantul, Angka Kematian Ibu tahun 2014 sejumlah 2 kasus yaitu pendarahan dan penyakit jantung yang dialami oleh ibu bersalin dan ibu hamil. Diketahui jumlah seluruh ibu hamil pada tahun 2016 sejumlah 460 ibu hamil. Kunjungan ANC (*Antenatal Care*) pada ibu hamil yang fisiologis sejumlah 439 dan yang patologi/beresiko sejumlah 21 ibu hamil.

Tujuan : Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil trimester III, menggunakan pendekatan manajemen kebidanan 7 langkah Varney dan SOAP.

Metode Penelitian : Menggunakan metode *deskriptif*, di Puskesmas Sedayu II Bantul Yogyakarta, dengan teknik pengambilan data primer dan data sekunder.

Hasil : Setelah dilakukan asuhan kebidanan dan melakukan kunjungan rumah pasien dalam keadaan baik.

Kesimpulan : Melakukan asuhan sebanyak tiga kali, di Puskesmas Sedayu II Bantul Yogyakarta dan melakukan kunjungan rumah ibu mengalami ketidaknyamanan pada trimester III dan bisa teratas dengan baik, keadaan ibu kembali normal.

Kata Kunci : Hamil, Trimester III

-
1. Mahasiswa Universitas Alma Ata
 2. Dosen Universitas Alma Ata
 3. Dosen Universitas Alama Ata

ABSTRACT

MIDWIFERY CARE IN 3rd TRIMESTER OF PREGNANT NY. T IS 40 YEARS OLD G₃P₂A₀Ah₂ 29⁺² WEEK AT PUSKESMAS SEDAYU II BANTUL IN 2017

Yuli Rian Dina¹, Nur Indah Rahmawati², Prasetya Lestari³

Background: According to the World Health Organization (WHO), in 2013 the Maternal Mortality Rate (AKI) in the world is 210 per 100,000 live births, AKI in developing countries is 230 per 100,000 live births and AKI in developed countries 16 per 100,000 live births. AKI in East Asia is 33 per 100,000 live births. In South Asia is 90 per 100,000 live births. In Southeast Asia is 140 per 100,000 live births and in West Asia is 74 per 100,000 live births. Based on the data obtained, at Sedayu II Public Health Center in Bantul, the number of maternal deaths in 2014 is 2 cases, namely bleeding and heart disease experienced by maternity mothers and pregnant women. Given the total number of pregnant women in 2016 is 460 pregnant women. The ANC (Antenatal Care) visit to a physiologic pregnant woman was 439 and the pathology / risk was a total of 21 pregnant women.

Purpose: Providing midwifery care to third trimester pregnant women is done by using a 7-step obstetric management approach Varney and SOAP.

Research methods: Using descriptive method, in Puskesmas Sedayu II Bantul Yogyakarta, with primary data retrieval technique and secondary data.

Results: After midwifery care and home visits 3 times, the patient is in good condition.

Conclusion: After doing the care as much as 3 times in Puskesmas Sedayu II Bantul Yogyakarta and experiencing the inconvenience of 3rd trimester pregnant and it can be resolved well. For the result, mother's condition returns to normal

Keywords: Pregnant, 3rd Trimester

-
1. Student of Universitas Alma Ata
 2. Lecturer of Universitas Alma Ata
 3. Lecturer of Universitas Alama Ata