

HUBUNGAN TINGKAT DEPRESI DAN KUALITAS HIDUP CAREGIVER PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEDAYU II BANTUL YOGYAKARTA

Rachmani Ridhawati¹. Imram Radne Rimba Putri². Mulyanti²
Email : Rachmani123@gmail.com

INTISARI

Latar Belakang : Pasien Skizofrenia tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal sehingga membutuhkan *caregiver*. *Caregiver* pada pasien Skizofrenia dapat menderita morbiditas psikologis karena beban yang dipikul selama perawatan dan pengasuhan pasien Skizofrenia. Depresi adalah gangguan psikologis yang paling umum ditemui. Jika kondisi tersebut terus berlangsung maka hal ini sangat berbahaya untuk keberlangsungan hidup manusia yang dapat berdampak pada kualitas hidup *caregiver* tersebut.

Tujuan: Mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat depresi dan kualitas hidup *caregiver* penderita Skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Sedayu 2 Bantul Yogyakarta.

Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode studi kuantitatif. Rancangan penelitian ini adalah rancangan penelitian *Cross Sectional*. Sample penelitian sebanyak 54 responden diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner tingkat depresi dan kualitas hidup.

Hasil Penelitian : *Caregiver* rata-rata mengalami depresi tingkat sedang (BDI 23). Tingkat kualitas hidup *caregiver* rata-rata masuk dalam kategori baik (*S-CGQOL* 58). Hasil dari uji Kendal's tau nilai sig $0.278 > 0.05$ maka tidak ada hubungan antara tingkat depresi dan kualitas hidup *caregiver* pasien Skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Sedayu 2 Bantul Yogyakarta.

Kesimpulan : tidak ada hubungan antara tingkat depresi dan kualitas hidup *caregiver* pasien skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Sedayu 2 Bantul Yogyakarta.

Kata kunci : *tingkat depresi, kualitas hidup, skizofrenia*

1. Mahasiswa Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu- Ilmu Kesehatan, Universitas Alma Ata Yogyakarta.
2. Dosen Universitas Alma Ata Yogyakarta

THE RELATIONSHIP OF DEPRESSION LEVEL AND LIFE QUALITY OF CAREGIVER ON SKIZOFRENIA PATIENTS IN THE WORKING AREA OF PUSKESMAS SEDAYU II BANTUL YOGYAKARTA

Rachmani Ridhwati¹. Imram Radne Rimba Putri². Mulyanti²
Email : Rachmani123@gmail.com

ABSTRACT

Background: Schizophrenic patients cannot do normally daily activities, so they need caregivers. Caregiver of Schizophrenic patients can have psychological morbidity because of the burden during treatment for Schizophrenia. Depression is the most common psychological disorder. If the conditions continues, this is very dangerous for human survival which can give an impact on caregiver's life quality.

Objective: To find out the relationship between the depression level and life quality of caregivers on schizophrenic patients in the work area of Puskesmas Sedayu 2, Bantul, Yogyakarta.

Research Methods: This study uses quantitative study methods. The design of this study was a Cross Sectional study design. The sample of this study are 54 respondents who taken using a purposive sampling technique. The instruments of this study were questionnaires about depression level and life quality.

Findings: The majority of caregiver has moderate depression (BDI 23). Most of caregiver has life quality in the good category (S-CGQOL 58). The results of the Kendal's statistic test revealed the sig value $0.278 > 0.05$, there is no correlation between the level of depression and the life quality of schizophrenic patient's caregivers in the work area of Puskesmas Sedayu 2 Bantul Yogyakarta.

Conclusion: there is no correlation between the depression level and the quality of life of caregivers on schizophrenic patients in the working area of Puskesmas Sedayu 2, Bantul, Yogyakarta.

Keywords : depression level, life quality, schizophrenia

1. Students of Nursing Science Study Program, Faculty of Health Sciences, University of Alma Ata Yogyakarta.

2. Lecturer at the University of Alma Ata Yogyakarta