

**GAMBARAN FAKTOR RISIKO IBU BERSALIN DENGAN
PERDARAHAN POSTPARTUM DI RSUD WONOSARI
GUNUNGGKIDUL YOGYAKARTA
TAHUN 2010¹**

Nurliliani², Asri Hidayat³, Yhona Paratmanitya,⁴

INTISARI

Latar Belakang : Kematian maternal telah lama digunakan sebagai indikator yang memberikan petunjuk mengenai tingkat kesehatan wanita yang berhubungan dengan perilaku reproduksi. Perdarahan postpartum merupakan komplikasi persalinan yang relatif umum dan dapat secara serius membahayakan keadaan ibu. Berdasarkan studi pendahuluan di RSUD Wonosari Gunungkidul Yogyakarta pada tahun 2010 terdapat 42 kasus ibu yang mengalami perdarahan postpartum.

Tujuan : untuk diketahuinya faktor risiko umur, paritas, riwayat persalinan dan jarak kehamilan terhadap kejadian perdarahan postpartum pada ibu bersalin di RSUD Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta tahun 2010.

Metode : Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan rancangan penelitian *cross sectional*. Subyek penelitian adalah ibu yang melahirkan dan dirawat di RSUD Wonosari Gunungkidul Yogyakarta, penelitian ini menggunakan data sekunder dari RM di Unit Kebidanan. Data analisis dengan menggunakan distribusi frekuensi.

Hasil : penelitian di dapat bahwa subyek penelitian berjumlah 36 orang yang masuk kriteria inklusi dengan frekuensi usia paling banyak 20-35 tahun sebanyak 23 orang (63,89%), frekuensi paritas sebagian besar dibawah 4 sebanyak 34 orang (94,44%), frekuensi riwayat persalinan sebagian besar riwayat persalinan normal 35 orang (97,22%), frekuensi jarak kehamilan sebagian besar diatas 2 tahun berjumlah 32 orang (88,89%), retensi sisa plasenta menduduki peringkat pertama yang menyebabkan perdarahan postpartum (38,89%).

Kesimpulan : kejadian ibu bersalin yang mengalami perdarahan postpartum sebagian besar berdasarkan umur sebagian besar berumur antara 20-35 tahun 23(63,89%) , berdasarkan paritas sebagian besar dibawah 4 adalah 34(94,44%), berdasarkan riwayat persalinan sebagian basar riwayat persalinan normal 35(97,22%), dan berdasarkan jarak kehamilan sebagian besar diatas 2 tahun 32 (88,89%).

Kata Kunci :Gambaran faktor risiko ibu bersalin dengan perdarahan postpartum.

¹Judul Karya Tulis Ilmiah

²Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan STIKES Alma Ata Yogyakarta

³Dosen STIKES Alma Ata Yogyakarta

⁴Dosen STIKES Alma Ata Yogyakarta

**OVERVIEW OF RISK FACTORS WITH MATERNAL POSTPARTUM
HEMORRHAGE IN WONOSARI HOSPITAL
GUNUNGGKIDUL YOGYAKARTA
YEAR 2010¹**

Nurliliani², Asri Hidayat³, Yhona Paratmanitya⁴

ABSTRACT

Background: Maternal Mortality has long been used as indicators that provide clues about the health of women who berhubungan with reproductive behavior. Postpartum hemorrhage is a relatively common complication of childbirth and can seriously endanger the mother's circumstances. Based on preliminary studies in hospitals Wonosari Gunungkidul Yogyakarta in 2010 there were 42 cases yangg mothers experiencing postpartum hemorrhage.

Objective: to know the risk factors age, parity, history of childbirth and pregnancy spacing on the incidence of postpartum hemorrhage in mothers in maternity hospitals Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta tahun 2010.

Methods: This type of research is descriptive by using cross-sectional study design. Subjects were mothers who gave birth and treated at hospitals Wonosari Gunungkidul Yogyakarta, this study uses secondary data from the RM in the Obstetric Unit. Data analysis using frequencydistribution.

Results: The study can be that the study subjects totaled 36 people who entered the inclusion criteria with a frequency of 20-35 years of age at most as many as 23 people (63.89%), parity frequencies mostly below 4 as many as 34 people (94.44%), frequency of a history of labor largely a history of normal deliveries 35 people (97.22%), the frequency spacing of pregnancy most of the above 2-year amounted to 32 people (88.89%), retention of the remaining placenta was ranked first cause of postpartum hemorrhage (38.89%).

Conclusion: The incidence of birth mothers who experience postpartum hemorrhage largely based on the age of majority aged between 20-35 years 23(63,89%), based on parity mostly under 4 is 34(94,44%), based on the history of labor in part Basar history of normal delivery 35(97,22%), and pregnancy is largely based on the distance over 2 years 32(88,89%)

Keywords: Overview of rish factors with maternal postpartum hemorrhage.

¹ Title of the research

² Student of DIII Midwifery STIKES Alma Ata Yogyakarta

³ Lecturer of STIKES Alma Ata Yogyakarta

⁴ Lecturer of STIKES Alma Ata Yogyakarta