

**TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER I TENTANG  
PENANGANAN EMESIS GRAVIDARUM DI BPS SRIMARTUTI  
KEMBANGSARI PIYUNGAN BANTUL  
YOGYAKARTA 2010**

**INTISARI**

Puspita<sup>1</sup>, Sri Subiyatun<sup>2</sup>, Nining Sulistyawati<sup>3</sup>

**Latar Belakang Masalah.** Perasaan mual dan muntah pada ibu hamil dinamakan emesis gravidarum. Rasa mual dan muntah ini disebabkan karena terjadinya peningkatan hormon-hormon kehamilan. Mual dan muntah yang terus berlangsung mengakibatkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi dan bisa menyebabkan hiper emesis. Penanganan yang tepat pada ibu hamil dengan emesis gravidarum sangat penting agar kekhawatiran ibu tentang keluhannya itu dapat dikurangi dengan memberi informasi cara menyikapinya dan mengantisipasi keluhan yang menyebabkan ketidaknyamanan ibu.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil trimester I tentang penanganan emesis gravidarum di BPS Sri Martuti Kembangsari, Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta tahun 2010.

**Metode Penelitian.** Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei yang termasuk dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil trimester I yang memeriksakan kehamilannya di BPS Sri Martuti Kembangsari, Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta pada tanggal 24 Juli – 23 Agustus 2010 berjumlah 47 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *total sampling*. Sampel berjumlah 47 responden. Instrumen penelitian menggunakan kuisioner.

**Hasil penelitian.** Ibu hamil trimester I di BPS Sri Martuti Kembangsari, Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta tahun 2010 sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan baik tentang penanganan emesis gravidarum sebesar 38,3%, umur 20 – 35 tahun berjumlah 39 orang (83,0%), pendidikan menengah berjumlah 29 orang (61,7%) dan responden termasuk kelompok multipara berjumlah 36 orang (76,6%) .

**Kesimpulan.** Ibu hamil trimester I di BPS Sri Martuti Kembangsari, Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta tahun 2010 sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan baik tentang penanganan emesis gravidarum.

Kata kunci: pengetahuan, hamil, trimester I, emesis gravidarum

- 
1. Mahasiswa Program Studi D III Kebidanan di STIKES Yogyakarta
  2. Dosen Program Studi D III Kebidanan di STIKES Yogyakarta
  3. Dosen Program Studi D III Kebidanan di STIKES Yogyakarta.

**THE LEVEL OF KNOWLEDGE FIRST TRIMESTER PREGNANT WOMEN  
ABOUT THE HANDLING OF EMESIS GRAVIDARUM  
IN BPS SRIMARTUTI KEMBANGSARI PIYUNGAN  
BANTUL YOGYAKARTA 2010**

**ABSTRACT**

Puspita<sup>1</sup>, Sri Subiyatun<sup>2</sup>, Nining Sulistyawati<sup>3</sup>

**Background.** Feelings of nausea and vomiting in pregnant women called emesis gravidarum. Nausea and vomiting is due to the increase in pregnancy hormones. Nausea and vomiting caused ongoing carbohydrate and fat reserves used up for energy purposes and could cause hyper emesis. The correct handling of pregnant women with emesis gravidarum is very important for the mother worries about the grievances that can be reduced by giving information on how to react to and anticipate complaints that cause discomfort mother. The purpose of this study was to determine the level of knowledge first trimester pregnant women about the handling of emesis gravidarum in BPS Sri Martuti Kembangsari, Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta in 2010.

**Research Methods.** This type of research is that survey research including descriptive study with cross sectional approach. The population in this study is the first trimester pregnant women who examined her pregnancy in BPS Sri Martuti Kembangsari, Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta on July 24 - August 23, 2010 amounted to 47 people. Technique sampling use total sampling. The sample amounted to 47 respondents. The research instrument used a questionnaire.

**Results.** First trimester pregnant women in BPS Sri Martuti Kembangsari, Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta in 2010 most have good knowledge about the handling of emesis gravidarum by 38.3%, aged 20-35 years amounted to 39 people (83.0%), a secondary education amounted to 29 people (61.7%) and respondents included multipara group totaled 36 people (76.6%).

**Conclusion.** First trimester pregnant women in BPS Sri Martuti Kembangsari, Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta in 2010 most have good knowledge about the handling of emesis gravidarum.

Keyword: knowledge, pregnant, trimester I, emesis gravidarum

- 
1. Student of Program Diploma Midwifery Studies at STIKES Alma Ata Yogyakarta.
  2. Lecture of Midwife Educator in STIKES Alma Ata Yogyakarta.
  3. Lecture of Midwife Educator in STIKES Alma Ata Yogyakarta.